COMUNICADO OFICIAL ENFEN N°20-2026
13 noviembre 2026

Alerta de El Niño Costero[1]

EL NIÑO COSTERO CONTINUARÍA HASTA INICIOS DE INVIERNO DE 2027

El calentamiento del mar se mantiene en gran parte del Pacífico tropical, alcanzando su máxima intensidad en la superficie frente a la costa peruana (Figura 1). El Niño costero (región Niño 1+2), iniciado en marzo de 2026, se mantendría con una magnitud extraordinaria[2] hasta febrero de 2027 (Figura 2) debilitándose progresivamente hasta julio de 2027. Asimismo, El Niño en el Pacífico central (región Niño 3.4) continuaría con una magnitud muy fuerte[3] hasta febrero de 2027, iniciando posteriormente un declive que llevaría a una condición neutra en junio de 2027 (Figura 2).




Figura 1. Anomalía de la temperatura superficial del mar (°C) en el Pacífico Tropical del 1 al 12 de noviembre de 2026. Las zonas delimitadas, indican las regiones Niño 3.4 (El Niño-Pacífico ecuatorial central) y Niño 1+2 (El Niño Costero).




Figura 2. Probabilidades mensuales estimadas por la Comisión Multisectorial del ENFEN, según el índice ICEN[4] para la región Niño 1+2 (El Niño Costero) y según el índice RONI[5] para la región Niño 3.4 (El Niño).

[1] https://enfen.imarpe.gob.pe/download/nota-tecnica-enfen-02-2026-sistema-de-alerta-ante-el-nino-costero-y-la-nina-costera/?

[2] https://enfen.imarpe.gob.pe/download/nota-tecnica-enfen-01-2024-definicion-operacional-de-los-eventos-el-nino-costero-y-la-nina-costera-en-el-peru/?wpdmdl=1905&refresh=6ab6d90a59c821790368010

[3] https://cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso/roni/strengths/

[4] https://enfen.imarpe.gob.pe/download/nota-tecnica-enfen-01-2024-definicion-operacional-de-los-eventos-el-nino-costero-y-la-nina-costera-en-el-peru/?wpdmdl=1905&refresh=6ab8fccbae3281790508235

[5] https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso/roni/pdf/roni-info-may-2026.pdf

Ante estos escenarios de calentamiento anómalo del mar, se prevé lo siguiente:



- Las precipitaciones, de noviembre 2026 a enero 2027[6] continuarían por encima de lo normal en la costa norte, sierra norte occidental, costa central y sierra central occidental, incrementándose la ocurrencia de los episodios de moderada a fuerte intensidad, en particular en la costa norte. Por el contrario, en la sierra sur oriental, sierra centro oriental y la Amazonía, las precipitaciones serían de normales a inferiores; en la región del Titicaca, se esperan precipitaciones inferiores a lo normal.

- Para el verano de 2027[7], las precipitaciones se mantendrían por encima de lo normal a lo largo de toda la costa, la sierra norte occidental y central occidental, siendo estas más intensas y con mayor frecuencia en la costa norte; mientras que, en la sierra suroriental, sierra centro oriental y la región amazónica se esperan lluvias inferiores o dentro de lo normal.



- Los caudales continuarían superiores a lo normal[8] en los ríos de la costa norte, tales como Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque, en particular los ríos Tumbes y Piura donde serían muy superiores. Esta tendencia se extendería hacia la costa centro y sur desde enero de 2027 para los ríos Chillón, Rímac, Lurín, Pisco e Ica. En contraste, en la sierra sur centro oriental los caudales se mantendrían de normal a inferior. Por otro lado, los ríos tributarios del Lago Titicaca continuarían con caudales por debajo de lo normal, afectando la recuperación del nivel del lago Titicaca. Para la Amazonía, en la selva norte los caudales continuarían normales, pero en el centro y sur serían menores a lo normal, en los ríos como el Ucayali, Huallaga, Apurímac y Vilcanota.



- La temperatura del aire mantendría registros muy superiores a lo habitual en toda la costa peruana, con el registro de nuevos récords hacia el verano.



- Los volúmenes de agua en los embalses de la costa norte podrían mantenerse en sus niveles actuales o con muy ligeros aumentos; por el momento el embalse Tinajones (Lambayeque) no alcanzaría los niveles de operación normales. Por otro lado, los embalses ubicados en el centro y sur del país continuarían descendiendo, cubriendo las demandas hídricas con normalidad, a diferencia del embalse Paucarani (Tacna), que podría continuar descendiendo hasta niveles muy bajos.



- La anchoveta continuaría presentando núcleos de concentración en zonas muy cercanas a la costa y con una distribución más profunda que lo normal. La samasa continuaría presentando una importante disponibilidad en el norte de litoral. Por otra parte, en la costa centro-norte se mantendría la disponibilidad de los peces machete de hebra y sierra, así como del langostino café, mientras que especies como el perico, atún aleta amarilla y melva seguirían presentes frente a toda la costa.



- El nivel del mar se mantendría por encima de su nivel medio en todo el litoral, con una mayor elevación en la zona norte. Asimismo, durante diciembre 2026 y enero 2027, se prevé una mayor probabilidad de ocurrencia de oleajes anómalos provenientes del norte, potencialmente de mayor impacto, sin descartar la presencia de oleajes provenientes del sur. Estas condiciones, al coincidir con niveles elevados del mar, incrementaría el riesgo de inundación y erosión costera, principalmente en playas de baja pendiente.

[6] https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02262SENA-77.pdf
[7] https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02261SENA-25.pdf
[8] https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02694SENA-75.pdf

Se exhorta a las autoridades y a la población a mantenerse informadas a través de los Avisos Especiales de Oleajes[9] publicados por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.

Se mantiene la recomendación hacia la población ubicada en zonas expuestas a lluvias intensas, inundaciones, movimientos en masa y peligros asociados, que deben reforzar la protección de sus viviendas y estar alerta de la información de las autoridades locales.

Se exhorta a los tomadores de decisiones considerar los estudios de escenarios de riesgo[10] actualizados, elaborados en base a los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales para la reducción de riesgo de desastres y la preparación ante peligros inminentes.

Se insta a las autoridades y a la ciudadanía consultar los canales oficiales del ENFEN y de sus entidades técnico científicas adscritas. Se pone a disposición de los tres niveles de gobierno el uso del Visor[11] INDECI como herramienta de soporte técnico para la gestión de emergencias.

Esta Comisión mantiene el monitoreo continuo de las condiciones oceánicas, atmosféricas, hidrológicas y biológicas-pesqueras para actualizar sus perspectivas. El próximo Comunicado Oficial se emitirá el lunes 30 de noviembre de 2026.

Comisión Multisectorial encargada
del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño

[9] https://www.dhn.mil.pe/portal/

[10] https://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/22787

[11] https://geo.indeci.gob.pe/visorindeci/